

Ящур – остро протекающая высококонтагиозная вирусная болезнь домашних и диких парнокопытных животных, характеризующаяся лихорадкой и афтозными поражениями слизистой оболочки ротовой полости, бесшерстных участков кожи головы, вымени, венчика, межкопытцевой щели и сопровождающаяся нарушением движения; у молодых животных – поражением миокарда и скелетных мышц.

В рамках регионализации по ящуру Международным эпизоотическим бюро (МЭБ) Россия разделена на четыре зоны. Астраханская область вошла в признанную МЭБ благополучную с вакцинацией зону по ящуру, что позволяет предотвращать возникновение и распространение вируса на территории Астраханской области. В сложившейся ситуации на территорию Астраханской области запрещен ввоз животных из региона с неустановленным статусом и неблагополучного региона, а также ввоз в регион, имеющий статус благополучный без вакцинации.

Распространение ящура приводит к масштабному выбытию продуктивных животных, значительному экономическому ущербу, снижению экспортного потенциала страны, инвестиционной привлекательности отрасли АПК.

В целях недопущения возникновения и распространения заболевания необходимо:

- предоставлять по требованиям специалистов органов и учреждений, входящих в систему Государственной ветеринарной службы Российской Федерации, восприимчивых животных для проведения клинического осмотра и вакцинации против ящура;
- проводить ежедневный осмотр восприимчивого поголовья;
- извещать в течение 24 часов специалистов госветслужбы обо всех случаях внезапного падежа или заболевания восприимчивых домашних и диких животных, а также об изменениях в их поведении, указывающих на возможное заболевание;
- принимать меры по изоляции подозреваемых в заболевании восприимчивых животных, а также восприимчивых животных, находящихся в контакте с подозреваемыми в заболевании ящерами восприимчивых животных, обеспечить изоляцию трупов восприимчивых животных;
- выполнять требования специалистов госветслужбы в хозяйствах в которых содержатся восприимчивые животные;
- соблюдать условия, запрета, ограничения в связи со статусом региона, на территории которого расположено хозяйство, установленным решением федерального органа исполнительной власти в области ветеринарного надзора о регионализации по ящуру;
- не допускать смешивания восприимчивых животных из разных стад при их выпасе и водопое.
- исключить выпас рогатого скота и верблюдов на территории 30 км вглубь Астраханской области от границы с Республикой Казахстан;

- обеспечить функционирование программ биобезопасности на животноводческих и перерабатывающих предприятиях;
- исключить возможность заноса возбудителя ящура с кормами, подстилкой, навозом и продукцией животного происхождения;
- вести учет и биркование восприимчивых домашних животных.

Ответственность за здоровье и содержание животных несут их владельцы.

Памятка для населения по профилактике Ящура животных

ЯЩУР – остро протекающая высококонтагиозная вирусная болезнь домашних и диких парнокопытных животных. Инкубационный период составляет до 14 календарных дней.

Клинические признаки заболевания:

наличие везикул и эрозий на слизистой оболочке ротовой полости, на коже венчика и межкопытцевой щели, носового зеркала, вымени (молочных желез). У больных восприимчивых животных наблюдаются слюнотечение, повышение температуры тела, хромота и снижение аппетита.

Фактор

продукция животного происхождения, корма, одежда и обувь персонала, обслуживающего восприимчивых животных, инвентарь и иные материально-технические средства, контаминированные вирусом.

передачи

Инкубационный период болезни составляет до 14 календарных дней.

вируса:

МЕРЫ ПРОФИЛАКТИКИ:

- извещать в течение 24 часов специалистов госветслужбы обо всех случаях внезапного падежа или заболевания восприимчивых животных, а также об изменениях в их поведении, указывающих на возможное заболевание;
- принимать меры по изоляции подозреваемых в заболевании восприимчивых животных, а также восприимчивых животных, находящихся в контакте с подозреваемыми в заболевании ящерам восприимчивых животных, обеспечить изоляцию трупов восприимчивых животных;
- выполнять требования специалистов госветслужбы в хозяйствах в которых содержатся восприимчивые животные;
- соблюдать условия, запрета, ограничения в связи со статусом региона, на территории которого расположено хозяйство, установленным решением федерального органа исполнительной власти в области ветеринарного надзора о регионализации по ящуре;
- не допускать смешивания восприимчивых животных из разных стад при их выпасе и водопое.

ВАЖНО!! Основной путь инфицирования людей – через сырое молоко больных животных и продукты его переработки, реже через мясо. От человека к человеку инфекция не передается. Распространение ящура приводит к масштабному выбытию продуктивных животных, значительному экономическому ущербу, снижению экспортного потенциала страны, инвестиционной привлекательности отрасли АПК.

Для профилактики ящура специалистами ветеринарной службы Астраханской области проводится вакцинация восприимчивых животных против ящура раз в 6 месяцев вакцинами согласно инструкциям по их применению.

